

Lesson 3: PREVENTING HIV INFECTION



...En el caso de nuestro país, las personas más afectadas por el VIH son jóvenes o adultos jóvenes, encontrándose una mayor prevalencia en los grupos etáreos de entre 20 y 30 años. Los motivos de ello probablemente radiquen en que los jóvenes todavía creen que el SIDA no afecta a las personas "comunes y corrientes" sino sólo a ciertos grupos marginales dentro de la sociedad."

Vidal, F. (2001) Consideraciones en torno a la sexualidad, la modernidad y educación sexual en Chile" Revista Electrónica Diálogos Educativos.



1. Averigüe qué significan las siguientes siglas en inglés? ¿Cuáles son las siglas equivalentes en castellano?

HIV - STD's - AIDS

2. ~~Comparta con sus compañeros~~: ¿Conoce algún caso relacionado con el contagio del SIDA?



Lea atentamente el siguiente texto.

- Abstinence from sexual relations is the safest way to prevent the sexual spread of STDs like HIV.
- Get tested and share your STD status with your partner before having sex. Then practice safe sex techniques to prevent infection.
- Use a new latex barrier (a male condom, female condom, or dental dam) at each vaginal, anal, or oral sex encounter.
- Use a water-based lubricant with condoms. Do not use baby oil or other oil-based lubricants such as Vaseline. They may cause holes in the condom, causing it to break.
- Products containing the spermicide nonoxynol-9 (found in most contraceptive creams, gels, suppositories, foams, films and sponges) help to prevent pregnancy but may increase the risk of HIV.
- Engaging in a committed, monogamous relationship with a person who is free from HIV or any other STD is safe if you both mutually agree to avoid high-risk sexual behaviors.
- Always use new sterile equipment and supplies. Don't share or use any needles that have been previously used for piercing, tattooing or injection.
- Don't share toothbrushes, floss, or razors.
- If you are HIV- positive, don't donate blood, plasma or organs.
- Get tested and seek treatment for HIV before becoming pregnant or as early as possible during the pregnancy.
- If you are HIV-positive, use baby formulas if they are available, since HIV can be transmitted through breast milk.



Cuando tenga una idea general acerca del texto, lea cada ejercicio y busque la información específica que necesita.

3. Lea y marque verdadero o falso. (True or False)

- | | |
|---|-------|
| a. HIV is a type of Sexual Transmission Disease. | T F |
| b. Monogamous people have more possibilities to be infected with HIV. | T F |
| c. Condoms protect only during vaginal sex encounters. | T F |
| d. HIV- positive can donate organs. | T F |
| e. HIV can be transmitted by breast milk. | T F |

4. Lea y responda en castellano de acuerdo al texto.

a. De acuerdo al texto, ¿cuál es la forma más segura de prevenir el SIDA?

b. En el texto, ¿qué se sugiere hacer cuando se van a iniciar relaciones sexuales con una pareja?

c. ¿Por qué se recomienda no usar vaselina o aceite para bebés como lubricantes de un preservativo?

d. ¿Cómo debería alimentar a su bebé una madre portadora de VIH?

e. ¿Qué es el nonoxynol-9 y cuáles son sus características?



Si necesita más información acerca del tema, usted puede visitar el sitio:
<http://www.prevent-hiv.com>